

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ОВАРИУМ КОМПОЗИТУМ (OVARIUM COMPOSITUM)

Регистрационное удостоверение

ЛП-№(001170)-(РГ-RU) от 30.08.2022

Торговое наименование

Овариум композитум

Лекарственная форма

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)):

Активные компоненты: Ovarium suis (овариум суис) D8 22,0 мкл, Placenta suis (плацента суис) D10 22,0 мкл, Uterus suis (утерус суис) D10 22,0 мкл, Salpinx suis (салпинкс суис) D10 22,0 мкл, Hypophysin suis (гипофизин суис) D13 22,0 мкл, Cypripedium calceolus var. Pubescens (циприпедиум кальцеолус вар. Пубесценс) D6 22,0 мкл, Lilium tigrinum (Lilium lancifolium) (лилиум тигринум, лилиум ланцифолиум) D4 22,0 мкл, Pulsatilla pratensis (пульсатилла пратенсис) D18 22,0 мкл, Aquilegia vulgaris (аквилегия вульгарис) D4 22,0 мкл, Seria officinalis (сепия официналис) D10 22,0 мкл, Lachesis mutus (лахезис мутус) D10 22,0 мкл, Arisinum (аписинум) D8 22,0 мкл, Kreosotum (креозотум) D8 22,0 мкл, Bovista (бовиста) D6 22,0 мкл, Ipecacuanha (ипекакуана) D6 22,0 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni (меркуриус солюбилис Ганемани) D10 22,0 мкл, Hydrastis canadensis (гидрастис канаденсис) D4 22,0 мкл, Acidum cis-aconicum (ацидум цис-аконитикум) D10 22,0 мкл, Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) D10 22,0 мкл.

Вспомогательные вещества: натрия хлорид q.s. для установления изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Применяется в качестве симптоматического средства у женщин в составе комплексной терапии при лечении нарушений менструального цикла.

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным компонентам или к любому из вспомогательных веществ; беременность, период грудного вскармливания; возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания


Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, в связи с недостаточностью клинических данных по безопасности у данной категории пациентов.

Способ применения и дозы

Применяют по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения определяется после консультации с врачом.

Как вскрыть ампулу?

Обращаться с осторожностью. Внимательно следуйте инструкциям по открыванию.



**ЦВЕТНАЯ ТОЧКА
ДОЛЖНА
НАХОДИТЬСЯ
ВВЕРХУ!**

Находящееся в головке ампулы содержимое следует стряхнуть с помощью легкого постукивания.

**ЦВЕТНАЯ ТОЧКА
ДОЛЖНА
НАХОДИТЬСЯ
ВВЕРХУ!**

После этого отломить верхнюю часть ампулы путем нажатия в месте нанесения цветной точки.

Любое оставшееся содержимое следует выбросить.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (в том числе из-за присутствия в составе гомеопатического разведения *Mercurius solubilis Hahnemanni*), а также случаи повышенного слюноотделения. При появлении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае, а также при появлении побочных эффектов или отсутствии терапевтического эффекта следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический. По 2,2 мл в ампулы из бесцветного стекла гидrolитического класса 1. На каждую ампулу нанесены насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую контурную ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых упаковок с 5 или 100 ампулами помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, 15, стр. 12
Телефон: +7 (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru