

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

Струмель® Т

Регистрационный номер

Торговое наименование

Струмель® Т

Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания гомеопатические.

Состав (на 1 таблетку):

Активные компоненты: Euspongia officinalis (Эуспонгия официналис) D3 150 мг, Calcium iodatum (Кальциум иодатум) D4 90 мг, Fucus vesiculosus (Фукус везикулозус) D4 30 мг;

Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской, от белого до желтовато-белого цвета, иногда с отдельными желтоватыми или сероватыми вкраплениями, без запаха или со слабым запахом йода.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

В комплексной терапии заболеваний щитовидной железы с гипотиреозом (*при заболеваниях щитовидной железы применение данного лекарственного средства не должно проводиться без предварительной консультации с лечащим врачом*).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, повышенная чувствительность к йоду, гиперфункция щитовидной железы; прием лекарственных препаратов, угнетающих функцию щитовидной железы; детский возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Если лечащий врач не рекомендует иначе, следует использовать препарат 3 раза в день по 1 таблетке, медленно рассасывая во рту до полного растворения. Средний курс лечения составляет 12 недель.

Побочное действие

Возможны тахикардия, раздражительность, потливость и другие симптомы тиреотоксикоза при длительных курсах лечения.

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При приеме больших количеств данного лекарственного средства могут наблюдаться диспептические явления, обусловленные наличием в его составе лактозы; усиление симптомов тиреотоксикоза.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно совместное применение с L-тироксином; по рекомендации и под контролем врача возможно снижение дозы L-тироксина.

При приеме других лекарственных средств следует посоветоваться с лечащим врачом.

Особые указания

Струмель® Т не заменяет препараты, назначаемые врачом при данном заболевании.

При врачебном обследовании щитовидной железы врача необходимо поставить в известность о приеме данного препарата, в противном случае оценка результатов обследований может быть некорректна.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае, или в случае отсутствия терапевтического эффекта следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для пациентов с сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, с механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

5 лет.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.01.2023 № 613
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, 15, стр. 12
Телефон: +7 (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru