

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ГЕПАР КОМПОЗИТУМ®
(Hepar compositum®)

Регистрационный номер:
ЛП-№(000169)-(РГ-RU)

Торговое наименование: Гепар композитум®

Лекарственная форма

Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)):

Активные компоненты: Hepar suis (гепар суис) D8 22 мкл, Cyanocobalaminum (цианокобаламинум) D4 22 мкл, Duodenum suis (дуоденум суис) D10 22 мкл, Thymus suis (тимус суис) D10 22 мкл, Colon suis (колон суис) D10 22 мкл, Vesica fellea suis (везика феллеа суис) D10 22 мкл, Pankreas suis (панкреас суис) D10 22 мкл, Cinchona pubescens (цинхона пубесценс) D4 22 мкл, Lycopodium clavatum (ликоподиум клаватум) D4 22 мкл, Chelidonium majus (хелидониум маюс) D4 22 мкл, Silybum marianum (силибум марианум) D3 22 мкл, Histaminum (гистаминум) D10 22 мкл, Sulfur (сульфур) D13 22 мкл, Avena sativa (авена сатива) D6 22 мкл, Fel tauri (фел таури) D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum (натриум диэтилоксалацетикум) D10 22 мкл, Acidum α -ketoglutaricum (ацидум альфа-кетоглутарикум) D10 22 мкл, Acidum malicum (ацидум маликум) D10 22 мкл, Acidum fumaricum (ацидум фумарикум) D10 22 мкл, Acidum thioccticum (ацидум тиоктитум) D8 22 мкл, Acidum oroticum monohydricum (ацидум оротикум моногидрикум) D6 22 мкл, Cholesterolum (холестеролум) D10 22 мкл, Calcium carbonicum Hahnemanni (кальциум карбоникум Ганеманни) D28 22 мкл, Taraxacum officinale (тараксакум официнале) D4 22 мкл, Synara scolymus (цинара сколимус) D6 22 мкл, Veratrum album (вератрум альбум) D4 22 мкл.

Вспомогательные вещества: вода для инъекций 1628 мг, натрия хлорид для установления изотонии.

Описание

Бесцветная или светло-розовая прозрачная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

В комплексной терапии острых и хронических заболеваний печени и желчного пузыря. В комплексной терапии заболеваний кожи воспалительного и невоспалительного характера (токсическая экзантема, дерматоз, дерматит, нейродермит).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания


Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно.


Курс терапии при острых заболеваниях 3-5 недель; при хронических заболеваниях не менее 4-8 недель. Терапию проводят под наблюдением врача.

Как вскрыть ампулу?



Держите ампулу таким образом, чтобы цветная точка находилась сверху!

Находящееся в головке ампулы содержимое следует стряхнуть с помощью легкого постукивания.



Держите ампулу таким образом, чтобы цветная точка находилась сверху!

После этого отломите верхнюю часть ампулы путем нажатия в цветной точке.

Побочное действие

В редких случаях возможны кожные реакции. В таком случае терапию этим препаратом следует прекратить и проконсультироваться у лечащего врача.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. При превышении рекомендованных доз необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает применение при данном заболевании других лекарственных средств.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Отсутствуют данные о влиянии препарата на способность к выполнению потенциально

опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический.

По 2,2 мл в ампулы из бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую ампулу нанесены насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую контурную ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых упаковок с 5 или 100 ампулами вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, 52, стр. 3

Телефон: (495) 937-78-25

E-mail: info@heel-russia.ru