

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ХЕПЕЛЬ®
(Hepel®)

Регистрационный номер

ЛП-№(000142)-(РГ-RU)

Торговое наименование

Хепель®

Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания гомеопатические

Состав (на 1 таблетку): активные компоненты: *Lycopodium clavatum* (*Lycopodium*) (ликоподиум клаватум (ликоподиум)) D3 30 мг, *Chelidonium majus* (*Chelidonium*) (хелидониум маюс (хелидониум)) D4 30 мг, *Cinchona pubescens* (*China*) (цинхона пубесценс (хина)) D3 30 мг, *Myristica fragrans* (*Nux moschata*) (миристика фрагранс (нукс мошата)) D4 30 мг, *Silybum marianum* (*Carduus marianus*) (силибум марианум (кардуус марианус)) D2 15 мг, *Phosphorus* (фосфорус) D6 15 мг, *Veratrum album* (вератрум альбум) D6 60 мг, *Citrullus colocynthis* (*Colocynthis*) (цитрюллуос колоцинтис (колоцинтис)) D6 90 мг; вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактоза до получения таблетки массой около 0,302 г.

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской, от белого до бежево-, оранжево-, или розовато-белого цвета, иногда с отдельными точечными вкраплениями розового или оранжевого цвета. Запах практически отсутствует.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

В комплексной терапии нарушений функций печени воспалительной и токсической этиологии.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе «Состав».
- Известная гиперчувствительность к Расторопше пятнистой (*Silybum marianum*) или иным растениям семейства сложноцветных, а также в случае гиперчувствительности к хинину.
- Беременность и период грудного вскармливания в связи с наличием в составе чистотела (*Chelidonium majus*) и чемерицы (*Veratrum album*).
- Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
- Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Лекарственный препарат Хепель противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания в связи с наличием в составе чистотела и чемерицы.

Способ применения и дозы

По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Курс терапии 2-3 недели.

Побочное действие

В редких случаях при приеме препаратов, содержащих хинин или хинидин, могут возникнуть реакции гиперчувствительности (кожная аллергия или лихорадка). В этих случаях необходимо проконсультироваться с врачом.

При приеме препаратов, содержащих алкалоиды чистотела, поступали единичные сведения о повышении показателей функциональной активности печени (трансаминаз) и концентрации билирубина вплоть до обусловленной лекарственными средствами желтухи (медикаментозно-токсический гепатит). Прекращение приема препарата приводит к нормализации этих показателей.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.

Пенал закрывать сразу после применения препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, 52, стр. 3

Телефон: (495) 937-78-25

Е-mail: info@heel-russia.ru